



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELÊMACO BORBA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**  
**Comissão de Farmácia e Terapêutica**



**Parecer 01/2023: Comissão de Farmácia e Terapêutica**

Ata de reunião:02/23 Data 06/07/2023

**Inclusão do medicamento: Polimixina B (sulfato)+ Neomicina (sulfato) + Flucinolona acetona+ Lidocaína (cloridrato) 10.000UI/ml+3,5+0,25+20mg/ml, Solução Otológica**

Com base em discussão realizada na data de 06 de julho de 2023 sobre a necessidade de inclusão de um antibiótico para otite externa aguda;

Considerando que o medicamento Polimixina (B) (sulfato)+ Neomicina (sulfato) + Flucinolona acetona+ Lidocaína (cloridrato) 1000UI/ml+3,5+0,25+20mg/ml, Solução Otológica está na RENAME versão 2022;

Considerando que o medicamento consta no elenco do Consórcio Paraná Saúde que proporciona ao município facilidade de aquisição, programação e economia de escala;

Considerando que o município não tem um antibiótico tópico para tratamento de otite externa padronizado;

A CFT decidiu por incorporar o medicamento a REMUME;

**Orientações sobre o uso do medicamento**

As otites são infecções bastante frequentes dentro dos serviços municipais de saúde. O uso indiscriminado e pouco criterioso dos antibióticos é uma das principais causas de cepas bacterianas resistentes, esse documento tem por objetivo orientar as equipes de saúde em relação as otites e promover o uso racional de medicamentos:

**Otite Externa Aguda-** Infecção bacteriana e/ou fúngica de parte ou totalidade da orelha externa. As principais bactérias responsáveis são *S. aureus* e *P. aeruginosa*. Em geral, a infecção está limitada ao conduto auditivo externo, mas pode se estender ao pavilhão auricular e à região periauricular. O principal sintoma é a otalgia intensa. Febre é pouco frequente. O tratamento se baseia no controle da dor e no uso de antibióticos tópicos (gotas).

**Otite média aguda-** Infecção bacteriana da orelha média (membrana timpânica e fenda auditiva). As principais bactérias responsáveis são *S. pneumoniae*, *H. influenzae* e *M. catarrhalis*. Os principais sintomas são otalgia, otorreia, hipoacusia e febre. O tratamento se baseia no controle da dor e uso de antibióticos sistêmicos.

O medicamento Polimixina (B) (sulfato)+ Neomicina (sulfato) + Flucinolona acetona+ Lidocaína (cloridrato) 1000UI/ml+3,5+0,25+20mg/ml, Solução Otológica- tem indicação para tratamento de otites externas

Posologia: três ou quatro gotas instiladas na orelha afetada, 2 a 4 vezes ao dia.